

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 12-7-84396490
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43-09.27.46

ÉDITION A OU B : 95 F

ÉDITION A + B : 160 F

BULLETIN N° 18 du 10 Juillet 1984

ÉDITION GRANDES CULTURES

Envoi n° 16

MILDIOU - POMME DE TERRE : Maintenir la protection.

PYRALE DU MAIS : Les premiers traitements dans 8 à 10 jours.

POIS DE PRINTEMPS

La situation sanitaire est satisfaisante : l'antracnose est rare, le botrytis est peu fréquent et n'évolue pas.

Le vol de tordeuse est toujours faible. En général, même en secteur d'ancienne culture, une deuxième intervention ne se justifie pas.

POMME DE TERRE

Aucune nouvelle tache de mildiou n'a été signalée depuis 10 jours.

L'arrivée d'une période orageuse étant annoncée, restez vigilant et maintenez la protection des parcelles.

Dans le cas d'utilisation de spécialités systémiques, intervenez sur végétation active, et ne dépassez pas 2 applications de ce type de produits au cours de la campagne.

MAIS

Pyrale : La sécheresse actuelle est peu favorable à l'activité des papillons. Les captures en pièges sexuels débutent faiblement et aucune ponte n'a encore été signalée à ce jour.

Compte tenu du retard du vol et de la végétation tardive, les premiers traitements avec des microgranulés devraient débuter en fin de semaine prochaine.

Les parcelles les plus précoces seront à traiter en priorité. Ne pas intervenir sur des plantes trop éloignées du stade "50 % des panicules mâles visibles dans le cornet".

Pucerons : Des colonies de Sitobion avenae (pucerons des épis des céréales) sont observées en culture.

Les populations de pucerons sont faibles et n'atteignent pas le seuil d'intervention (300 à 500 pucerons par plante jusqu'au stade 10 feuilles).

Sauf exception, aucune intervention ne se justifie dans l'immédiat.

Nous vous rappelons les risques de pullulations de pucerons, possibles après des applications de pyréthrinoides liquides (bulletin n° 16 du 21 Juin 1984).

REPONDEUR AVERTISSEMENTS (26) 87.40.78